

定期予防接種

	ワクチンの種類	標準的な接種期間	回数	対象年齢	注意事項
個別接種	ロタウイルス	ロタリックス： 生後2か月～出生24週0日後までに27日以上の間隔をおく	2回	出生6週0日後～ 出生24週0日後	○先天性消化管障害、腸重積、重症複合型免疫不全を有する方は接種できません。 ○同一ワクチンを続けて接種して下さい。 ○接種後特に1週間は腸重積の症状に注意して下さい。
		ロタテック： 生後2か月～出生32週0日後までに27日以上の間隔をおく	3回	出生6週0日後～ 出生32週0日後	
	ビブ [インフルエンザ菌b型]	初回：生後2か月～7か月未満までに27日以上の間隔で3回接種 追加：初回接種終了後7か月～13か月までの間隔をおく	初回3回 追加1回	生後2か月～5歳未満	
	小児用肺炎球菌	初回：生後2か月～7か月未満までに27日以上の間隔で3回接種 追加：初回接種後60日以上の間隔で1歳～1歳3か月未満に接種	初回3回 追加1回	生後2か月～5歳未満	
	B型肝炎	生後2か月～9か月未満までに接種 1回目接種後27日以上の間隔をおいて2回目を接種した後、1回目の注射から139日以上の間隔をおいて3回目を接種	3回	生後1歳未満	○母子感染予防として出生後にB型肝炎ワクチンの接種を受けたことがある場合は対象になりません。
	四種混合 [ジフテリア 破傷風 百日咳 不活化ポリオ]	初回：20日以上の間隔で3回接種 追加：初回接種終了後1年～1年半間隔をおく	初回3回 追加1回	第1期 生後3か月～7歳6か月未満	○接種後は1日～1週間頃、接種部位が赤く腫れることがあります。まもなく治ります。 ○間隔があいた場合は医師とよく相談して下さい。
	BCG	生後5か月～8か月未満に接種	1回	生後1歳未満	○接種後27日間は、  の予防接種は受けられません。
	MR 麻しん 風しん 混合	対象年齢と同じ	1回 1回	第1期 生後1歳～2歳未満 第2期 小学校就学前の1年間	○接種後27日間は、  の予防接種は受けられません。 ○麻しん、風しんのどちらか一方にかかったことがある方もワクチン接種の対象となります。
	水痘	追加接種は、初回接種から最低3か月の間隔をおく(標準的には6か月～12か月間)	初回1回 追加1回	生後1歳～3歳未満	○接種後27日間は、  の予防接種は受けられません。 ○水痘にかかったことがある方は対象になりません。
	日本脳炎	第1期 初回(2回)：3歳～4歳未満 追加(1回)：4歳～5歳未満 第2期：9歳～10歳未満	初回2回 追加1回 1回	第1期 生後6か月～7歳6か月未満 第2期 9歳～13歳未満	○H.7年4月2日～H.19年4月1日生のうち20歳未満の方で接種希望の場合は海南市健康課にご連絡ください。(特例措置があります)
	子宮頸がん予防ワクチン	中学1年生になる年度	3回	小学6年生～ 高校1年生相当の女子	○同一のワクチンを3回続けて接種して下さい。 2価ワクチン：サーバリックス 4価ワクチン：ガーダシル ※9価ワクチン：シルガード9(令和5年4月～)
	ジフテリア 破傷風混合 [三種混合の 第2期]	11歳～12歳	1回	11歳～13歳未満	○乳幼児期に三種混合を3回以上接種していなければ効果がありません。